



9 novembre 2020  
Mini Lecture 1.1

AFRAVIH

# Comment déployer la PrEP ?

Joseph Larmarange

# VIH Hépatites virales Santé sexuelle

Sous la direction de  
Christine Katlama • Jade Ghosn  
Gilles Wandeler

AFRAVIH

## PRÉVENTION DU VIH

Coordination : Joseph Larmarange, Jade Ghosn

Prévention du VIH – Introduction	J. Larmarange .....	683
<i>Prévention sexuelle</i>		
Stratégies comportementales et prévention mécanique	G. Pialoux .....	687
La circoncision	B. Auvert.....	692
Prophylaxie post-exposition	J. Ghosn, P. Gantner.....	697
Le traitement antirétroviral comme moyen de prévention (TasP)	J. Larmarange .....	702
Du TPE à la PrEP : l'approche globale en santé pour éradiquer le VIH	R. Thomas, A. Vassal .....	712
Prophylaxie préexposition (PrEP)	P. Gantner, C. Laurent, J. Larmarange, J. Ghosn.....	715
Dispositifs locaux de prévention du VIH pour les femmes	G. Pialoux.....	727
<i>Prévention et prise en charge des addictions aux drogues</i>		
Introduction à la prise en charge des addictions	J.M. Delile.....	730
Prise en charge des addictions au Sud	V. M.P. Cisse Diallo, M. Seydi, L. Michel ....	734
Prise en charge des addictions au Nord	J.M. Delile.....	743
<i>Vaccin préventif</i>		
	J.D. Lelièvre.....	750
<i>Prévention du VIH et soins</i>		
Soignants et risque de transmission virale en milieu de soins	É. Rouveix .....	759
Sécurité transfusionnelle et infection par le VIH	G. Brücker, S. Laperche .....	765





PrEP  
**UN COMPRIMÉ  
PAR JOUR  
VOUS PROTÈGE DU VIH**

- › PrEP efficace pour prévenir la transmission sexuelle
- › **Novembre 2015** : recommandation forte de l'OMS pour les personnes à risque substantiel
- › Baisse des nouvelles infections observée dans plusieurs régions où la PrEP a été massivement déployée
  - › San Francisco (US)
  - › Île-de-France (France)
  - › Nouvelles-Galles du Sud (Australie)






**PrEP**  
**UN COMPRIMÉ  
 PAR JOUR  
 VOUS PROTÈGE DU VIH**

**PRISE CONTINUE**

BIEN RESPECTER LES  
 7 PREMIERS JOURS  
 DE PRISE AVANT  
 TOUT RAPPORT !



**PRISE À LA DEMANDE**


1 SEUL RAPPORT  
 =  
 3 PRISES,  
 4 COMPRIMÉS



**Juillet 2019** : schéma 2+1+1 validé par l'OMS  
 pour les homosexuels masculins



# La PrEP, ce n'est pas que la PrEP



# La PrEP, pour qui ?

personnes à risque substantiel



groupes à incidence élevée



populations dites 'clés'



# Qui recrute-t-on dans les programmes PrEP ?

Majoritairement des personnes exposées qui ont besoin de la PrEP, **mais...**

- › **Prévenir** (Île-de-France)
  - › > 3000 personnes recrutées
  - › 99% sont des HSH / 35 ans en médiane
- › **DREAMS Kenya** (jeunes filles & adolescentes)
  - › Rétention 3 mois après initiation : 37% (Tapsoba et al. *AIDS Care* 2020)
- › **Bénin** (Travailleuses du Sexe Cotonou)
  - › Rétention M12 : 59% (Mboup et al. *JIAS* 2018)
- › **Difficultés à recruter**
  - › jeunes HSH
  - › travailleuses & travailleurs du sexe
  - › personnes trans\*
  - › migrant.e.s
  - › jeunes filles & adolescentes



**Quelles pistes ?**



# PrEP-CI ANRS 12361

- › **Objectif** : Évaluer la pertinence et les modalités d'une offre de PrEP à destination des travailleuses du sexe en Côte d'Ivoire
- › **Enquête qualitative** sur sites prostitutionnels (21 entretiens + 7 focus groups)
- › **Enquête quantitative** auprès de 1000 TS (quest. sociocomportemental + incidence)
- › **Approche participative**
  - › Travail avec deux ONG communautaires (Aprosam & Espace Confiance)
  - › Co-construction d'une offre de santé



# Les constats du projet PrEP-CI

## 1. Les TS restent une population exposée malgré le recours au préservatif

**87%** disent utiliser régulièrement le préservatif avec leurs clients

**88%** pas avec leur partenaire régulier  
Pas toujours utilisé avec les clients réguliers ou avec certains clients violents ou contre forte somme d'argent

Au final, **59%** ont eu au moins un rapport sexuel sans préservatif au cours des **7 derniers jours**

### **Incidence élevée :**

- > 3,2% San Pedro / 1,6% Abidjan
- > Y compris chez celle exerçant depuis plus de 5 ans



# Les constats du projet PrEP-CI

1. Les TS restent une population exposée malgré le recours au préservatif
2. **De nombreux besoins non couverts en santé sexuelle et reproductive**

**43%** ont déjà eu une grossesse non désirée au cours de leur vie  
mais seules **39%** utilisent une contraception

**36%** continuent de travailler pendant leurs menstruations

**65%** ont déclaré avoir eu au moins une IST au cours des douze derniers mois



# Les constats du projet PrEP-CI

1. Les TS restent une population exposée malgré le recours au préservatif
2. De nombreux besoins non couverts en santé sexuelle et reproductive
3. **Nécessité de (re)penser un suivi chronique des femmes VIH-**

La PrEP nécessite un **suivi trimestriel**

Le focus actuel des programmes est le dépistage de « nouvelles TS » et le suivi des positives avant tout.

Malgré le travail des paires-éducatrices, **peu de TS se rendent en clinique** :

- > éloignement / horaires
- > peur du stigma



# Les constats du projet PrEP-CI

1. Les TS restent une population exposée malgré le recours au préservatif
2. De nombreux besoins non couverts en santé sexuelle et reproductive
3. Nécessité de (re)penser un suivi chronique des femmes VIH-
4. **Il ne faut pas séparer les soins pour les VIH+ et pour les femmes VIH-**

## Retours des **acteurs de terrain**

Il ne faut pas créer de service parallèle  
Réduire le stigma associé aux soins si une seule consultation pour celles VIH+ et pour celles VIH-

Les VIH+ ont aussi besoin de services en santé sexuelle et reproductive

L'intégration des services est aussi une opportunité pour partager et réduire les coûts




# Les constats du projet PrEP-CI

1. Les TS restent une population exposée malgré le recours au préservatif
2. De nombreux besoins non couverts en santé sexuelle et reproductive
3. Nécessité de (re)penser un suivi chronique des femmes VIH-
4. Il ne faut pas séparer les soins pour les VIH+ et pour les femmes VIH-
5. **Prise en compte de l'hépatite B**

Contexte ivoirien marqué par une **forte prévalence de l'hépatite B** (~10%)





**PrEP VIH**

**Traitement  
Hépatite B**

si hépatite B chronique,  
recommandation OMS

En Côte d'Ivoire  
**Tenofovir à la charge du patient  
en cas de monoinfection VHB**

**Problème d'équité d'accès si  
gratuit pour PrEP VIH mais  
pas pour le traitement du VHB**





8<sup>e</sup> CONFÉRENCE  
INTERNATIONALE  
FRANCOPHONE

VIH/HEPATITES  
AFRAVIH 2016

20 AU 23 AVRIL 2016  
LE SQUARE-BRUXELLES



AFRAVIH 2018

9<sup>e</sup> Conférence Internationale Francophone

VIH/HEPATITES

Du 4 au 7 avril 2018

Bordeaux - Palais des Congrès





# Appel de Bruxelles pour la PrEP

Pour un accès universel à la PrEP !

# Appel mondial pour le renforcement de la lutte contre les hépatites B et C





ANRS 12381

# PRINCESSE



PRep · INfections sexuellement transmissibles  
Contraception · hÉpatite b · Santé SExuelle



## Les constats du projet PrEP-CI

1. Les TS restent une population exposée malgré le recours au préservatif
2. De nombreux besoins non couverts en santé sexuelle et reproductive
3. Nécessité de (re)penser un suivi chronique des femmes VIH-
4. Il ne faut pas séparer les soins pour les VIH+ et pour les femmes VIH-
5. Prise en compte de l'hépatite B

## Le projet PRINCESSE

### **Offre élargie de Santé Sexuelle et Reproductive**

VIH : traitement précoce, suivi / PrEP, dépistage...

VHB : bilan, vaccination, traitement

IST : dépistage (symptômes + labo) + traitements

Contraception gratuite / Coupes menstruelles

Tests de grossesse trimestriels

Repérage des addictions

### **Clinique mobile sur sites prostitutionnels**

avec médecin, technicien de laboratoire,

assistante sociale et paires éducatrices

chaque site est revisité toutes les 2 semaines

ensemble des services en mobile

dossier médical informatisé

**Premiers résultats attendus en 2021**



VIH

*Il faut que l'on apprenne à  
penser plus souvent en dehors  
du cadre unique du VIH*





Merci

AFRAVIH

