

Sondages 2023 · Paris · 24 mars 2023

Réalisation d'une enquête téléphonique répétée auprès de médecins burkinabés en contexte Covid retour d'expérience de l'enquête CAP-CoV-BF

Joseph Larmarange, Arlette Simo Fotso, Yao Abo, Désiré Dahourou, Zélie Godin, Kadidiatou Kadio, Apoline Sondo, Louis Valentin, Mathias Altman, Anne Bekelynck


Institut de Recherche pour le Développement (FR) Institut National des Études Démographiques (FR) Programme PAC-CI (CI) Institut de Recherche en Sciences de la Santé (BF) Université Joseph Ky-Zerbo (BF) Bordeaux Population Health / ISPED (FR)

Pandémie mondiale Covid-19

• mars 2020 · l'OMS qualifie l'épidémie de Covid-19 de pandémie mondiale



- L'AFD décide de financer le projet
 APHRO-CoV du consortium REACTing pour renforcer les systèmes de santé et la veille sanitaire du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali et du Sénégal
- Les **médecins**, maillon essentiel du système sanitaire, sont placés au cœur de la réponse
- Besoin de documenter leurs Connaissances,
 Attitudes et Pratiques (CAP)





Mise en place d'une enquête CAP

• des contraintes fortes :

- budget limité (~33 000 €)
- urgence à mettre en place l'enquête
- évolution inconnue de l'épidémie

• une **expérience passée** :

- enquête DOD-Cl réalisée en 2018
- par téléphone
- auprès de médecins, infirmières, sage-femmes

mars-avril 2020 · début des discussions


- choix du Burkina Faso (volonté des autorités locales pour participer)
- choix d'une enquête répétée
- souhait de maintenir un échantillonnage
- doute sur possibilité de réenquêter les mêmes personnes → enquêtes transversales répétées


Mise en place d'une enquête CAP

- identification d'un partenaire technique
 - CloudlyYours qui dispose d'un plateau d'appels au Burkina Faso
 - très réactif et ayant déjà travaillé avec d'autres équipes de recherche
 - données hébergées en France et soumises à RGPD
- contraintes budgétaires
 - → 3 vagues d'enquêtes de 150 à 200 personnes
- rédaction du **protocole** de recherche
 - finalisation du protocole en juin 2020
 - soumission au comité d'éthique national
 - autorisations obtenues en août 2020



Échantillonnage & Procédures









Refus de participer relativement limités

	Vague 1	Vague 2	Vague 3
Refus SMS	0	7	9
Base utilisée	496	563	450
Refus après décrochage	23	10	10
Injoignables	281	339	204
Hors-Cible	26	24	34
Quest. complétés	166	190	203
Durée enquête	15 jours	13 jours	13 jours



Des consultations perturbées par l'épidémie



- Patients venus pour des renseignements
- Patients qui pensent avoir contractés Covid
- Allongement du temps des consultations
- Réceptions d'appels téléphoniques




Évolution des mesures de prévention

mesures de routine

- adoptées par la majorité des structures de santé dès le début de l'épidémie et qui sont restées relativement stables sur les 3 enquêtes
- mesures partielles et conjoncturelles, davantage en lien avec les évolutions de l'épidémie, qui
 - adoptées de manière non systématique au début de l'épidémie,
 - légère baisse (2^e enquête)
 - ré-augmentation avec le pic épidémique de décembre 2020-janvier 2021

MESURES DE PRÉVENTION MISES EN PLACE PAR LA STRUCTURE

Quelle(s) mesures de prévention ont été mises en place et sont toujours en vigueur dans votre structure de santé ?




Disponibilité du matériel de protection

- Par rapport à septembre 2020, augmentation du nombre de médecins déclarant disposer au sein de leur structure de matériel de protection (en quantités suffisantes ou insuffisantes)
- Toutefois diminution de la proportion disposant de matériel de protection en quantité suffisante

DISPONIBILITE MATERIEL DE PROTECTION

Concernant le matériel de protection dont vous disposez dans votre structure principale d'exercice, disposez-vous actuellement de...




La vaccination ne fait pas consensus

AFFIRMATIONS SUR LE VACCIN

- Avis mitigés sur la vaccination
- Une moitié plutôt favorable
- Un cinquième plutôt sceptique
- Le reste indécis

Seule la moitié des médecins se dit prête à se faire vacciner contre la Covid-19




Le risque d'effets secondaire des vaccins contre la Covid-19 est faible


Dans l'idéal, une vaccination de masse est préférable à une vaccination ciblée


Les conditions de conservation actuelles des vaccins ne sont pas adaptées à la situation

Il faut rendre la vaccination obligatoire pour les groupes cibles

Les vaccins contre la Covid-19 doivent être rendus accessibles à la population













Discussion

- Réalisation d'une enquête nationale représentative en des temps courts et avec un budget limité
- Passation par téléphone a permis de couvrir tout le territoire et de respecter les procédures de distanciation en vigueur
- Pas de garantie de l'exhaustivité et de la mise à jour de l'annuaire de l'ordre des médecins
- Pour d'autres corps de métier, l'existence d'un tel annuaire peut être inexistante
- Enquêtes par téléphone ont un rôle à jouer en Afrique
- Réactivité / Adaptées aux crises sanitaires
- Cependant, peu d'acteurs avec plateau technique et expertise méthodologique
- Il est nécessaire de renforcer les capacités locales



Merci

Retrouvez les résultats de l'enquête sur https://aphro-cov.com/

Crédits photos : pexels.com